



Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Rapport sur la situation épidémiologique en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein

État au 13.04.2020, 8h 00


La Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont jusqu'à présent enregistré un total de 25 580 cas confirmés en laboratoire, ce qui signifie 280 cas supplémentaires en un jour. Le nombre de cas est soumis à une fluctuation hebdomadaire avec des nombres plus faibles le week-end. Tous les cantons suisses et la principauté de Liechtenstein sont concernés. La Suisse a ainsi l'une des incidences les plus élevées (298/100 000 habitants) en Europe. A l'heure actuelle, 885 personnes sont décédées en Suisse des suites d'un COVID-19 confirmé en laboratoire.

Ce rapport est basé sur les informations fournies par les laboratoires et les médecins à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans le cadre de la déclaration obligatoire. Les chiffres du jour se basent sur les déclarations que l'OFSP a reçues jusqu'à ce matin. C'est pourquoi ils peuvent diverger de ceux communiqués par les cantons.

Evolution

A ce jour, environ 196 600 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du COVID-19, dont 15% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne).

Figure 1: cas de COVID-19 déclarés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, selon la date du cas (qui correspond généralement à la date de prélèvement de l'échantillon)






Répartition par sexe et âge

L'âge des cas confirmés en laboratoire allait de 0 à 107 ans, avec un âge médian de 52 ans (50% des cas étaient plus jeunes et 50% plus âgés que cet âge). 47% des cas étaient des hommes, 53% des femmes. Les adultes étaient nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes étaient plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 60 ans, les femmes que les hommes (Figure 2). Pour les deux sexe, l'incidence était maximale chez les personnes âgées de 80 ans et plus.


Figure 2: incidence pour 100 000 habitants par sexe et âge des cas de COVID-19 déclarés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein



Répartition cantonale

Des cas ont été déclarés dans tous les cantons et dans la Principauté de Liechtenstein. Quelques cas concernaient des personnes n'ayant pas de domicile permanent dans les cantons auxquels ils ont été attribués. Par rapport à la taille de leur population, les cantons du Genève, Tessin, de Vaud et de Bâle-Ville étaient les plus touchés.

Figure 3: incidence cantonale pour 100 000 habitants des cas de COVID-19 déclarés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein




Hospitalisation

Des informations sont disponibles pour 2936 patients hospitalisés confirmés en laboratoire. Leur âge allait de 0 à 101 ans, avec un âge médian de 71 ans. 61% des personnes hospitalisées étaient des hommes et 39% des femmes.

Sur les 2547 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 13% n'avaient aucune maladie préexistante et 87% en avaient au moins une. Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension (chez 52% des personnes hospitalisées), les maladies cardiovasculaires (31%) et le diabète (23%).

Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (67%), la toux (64%) et les problèmes respiratoires (40%). De plus, 44% avaient une pneumonie.

Figure 4: cas de COVID-19 hospitalisés déclarés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein par sexe et âge



Décès

Jusqu'à présent, 885 personnes testées positives pour le COVID-19 en laboratoire sont décédées en Suisse. L'incidence des décès en Suisse était de 103 décès par million d'habitants. Parmi les personnes décédées, 539 étaient des hommes (61%) et 345 des femmes (39%). L'âge des personnes décédées allait de 31 à 101 ans, avec un âge médian de 84 ans. Sur les 853 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante. Les trois maladies préexistantes les plus fréquemment mentionnées étaient l'hypertension artérielle (chez 64% des personnes décédées), les maladies cardiovasculaires (55%) et le diabète (27%).

Figure 5: Nombre de personnes décédées des suites d'un COVID-19 confirmé en laboratoire par sexe et âge en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein

